



Tagpfauenauge

(*Inachis io*)

Flugzeit: immer, außer Juni

Häufigkeit: häufig

Spannweite: 50–55 mm

Lebensraum: Falter überall (besonders an duftenden Blüten); Raupe an Brennnesseln

Kleiner Fuchs (*Aglais urticae*)

Flugzeit: immer, außer Mitte Mai–Mitte Juni

Häufigkeit: häufig, Spannweite: 40–50 mm

Lebensraum: Falter überall (besonders an duftenden Blüten); Raupe an Brennnesseln



Admiral

(*Vanessa atalanta*)

Flugzeit: immer, besonders

August–September

Häufigkeit: häufig

Spannweite: 50–60 mm

Lebensraum: Falter überall an Blüten



Distelfalter (*Vanessa cardui*)

Flugzeit: Juni–September

Häufigkeit: vereinzelt bis häufig

Spannweite: 45–60 mm

Lebensraum: Falter überall an Blüten

Erläuterungen

Die Angaben unter den Namen (vor allem Häufigkeit und Lebensraum) beziehen sich auf den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Viele weitere Informationen zu Tag- und Nachtfaltern gibt es in dem Buch „Schmetterlinge der Ostfriesischen Inseln – Eine Anleitung für Entdecker“ ISBN 978-3-00-049104-7.

Illustrationen und Text

Carsten Heinecke

Gefördert von der Niedersächsischen Wattenmeerstiftung



Niedersächsische Wattenmeerstiftung

Herausgeber

Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer

Waldbrettspiel (*Pararge aegeria*)

Flugzeit: Mai–Mitte September

Häufigkeit: häufig

Spannweite: 32–42 mm

Lebensraum: Wälder,

Gärten und Parks



DIE HÄUFIGSTEN

Tagfalter

DER OSTFRIESISCHEN INSELN



Nationalpark
Wattenmeer



NIEDERSACHSEN

Mittlerer Perlmutterfalter
(*Argynnis niobe*)

Flugzeit: Mitte Juni–Ende Juli
Häufigkeit: vereinzelt–häufig
Spannweite: 43–55 mm
Lebensraum: Graudünen
und Umgebung



Ochsenauge

(*Maniola jurtina*)

Flugzeit: Mitte Juni
–Mitte September
Häufigkeit: häufig
Spannweite: 40–48 mm
Lebensraum: grasige Bereiche
mit Blüten



Großer Kohlweißling

(*Pieris brassicae*)

Flugzeit: Mai–Mitte September
Häufigkeit: vereinzelt
Spannweite: 50–65 mm
Lebensraum: fast überall,
vor allem am Strand



Kleiner Perlmutterfalter

(*Issoria lathonia*)

Flugzeit: Mai, Juli–September
Häufigkeit: vereinzelt
Spannweite: 35–45 mm
Lebensraum: Graudünen



Kleines Wiesenvögelchen

(*Coenonympha pamphilus*)

Flugzeit: Mitte Mai
–Mitte September
Häufigkeit: häufig
Spannweite: 23–33 mm
Lebensraum: Graudünen
und Grünland

Grünaderweißling

(*Pieris napi*)

Flugzeit: Mitte April
–September
Häufigkeit: häufig
Spannweite: 40–50 mm
Lebensraum: fast überall



Rostbinde

(*Hipparchia semele*)

Flugzeit: Mitte Juni
–Mitte September
Häufigkeit: häufig
Spannweite: 48–55 mm
Lebensraum: Weiß- und
Graudünen



Gemeiner Bläuling

(*Polyommatus icarus*)

Flugzeit: Mitte Mai–August
Häufigkeit: häufig
Spannweite: 25–30 mm
Lebensraum: Wegränder,
magere Wiesen, Graudünen



Kleiner Kohlweißling

(*Pieris rapae*)

Flugzeit: Mai–September
Häufigkeit: häufig
Spannweite: 40–50 mm
Lebensraum: fast überall



Mauerfuchs

(*Lasiommata megera*)

Flugzeit: Mai–Juni, Juli–August
Häufigkeit: selten
Spannweite: 35–45 mm
Lebensraum: grasige Dünen
(nur auf Borkum, Baltrum
und Langeoog)

Kleiner Feuerfalter

(*Lycena phlaeas*)

Flugzeit: Mitte April–Mitte Oktober
Häufigkeit: häufig
Spannweite: 22–27 mm
Lebensraum: magere,
vegetationsarme Flächen; Graudünen



Schwarzkolbiger Dickkopffalter

(*Thymelicus lineola*)

Flugzeit: Juli–Mitte September
Häufigkeit: häufig
Spannweite: 22–26 mm
Lebensraum: grasige Bereiche,
Falter auch gern in den Salzwiesen

